



Εμβόλιο COVID-19 NUVAXOVID

Γενικές Οδηγίες προς εμβολιαζόμενους

- ▶ Ο εμβολιασμός COVID-19 μειώνει τον κίνδυνο προσβολής ενός ατόμου από τον ιό SARS-CoV-2 ο οποίος προκαλεί τη νόσο COVID-19.
- ▶ Όπως όλα τα φάρμακα, κανένα εμβόλιο δεν είναι απολύτως αποτελεσματικό και χρειάζονται λίγες εβδομάδες μετά το εμβόλιο για τη δημιουργία προστασίας από τον οργανισμό. Γι' αυτό ακόμα και μετά τον εμβολιασμό το άτομο **πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τις συνήθεις πρακτικές ατομικής καθαριότητας και προστασίας, όπως συχνό πλύσιμο των χεριών, διατήρηση κοινωνικής απόστασης και χρήση μάσκας προσώπου.**
- ▶ Ορισμένα άτομα ενδέχεται να προσβληθούν από COVID-19 παρά το γεγονός ότι έχουν εμβολιαστεί, ωστόσο ο εμβολιασμός θα μειώσει τη σοβαρότητα της τυχόν λοίμωξης. Τονίζεται ότι, απαιτείται εμβολιασμός και με τις δύο (2) δόσεις εμβολίου για να μειωθεί η πιθανότητα ένα άτομο να νοσήσει σοβαρά ή να πεθάνει.
- ▶ Το εμβόλιο δεν μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια COVID-19 στον εμβολιαζόμενο.

1

Πριν την αποχώρησή σας από το Κέντρο Εμβολιασμού μετά τη χορήγηση της 1ης δόσης του εμβολίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει ραντεβού για τη 2η δόση

2

Για καλύτερη προστασία απαιτείται όπως εμβολιαστείτε και με τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου

3

Μετά τη χορήγηση της 1ης δόσης θα λάβετε Κάρτα Εμβολιασμού COVID-19 την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε όταν θα προσέλθετε για τη 2η δόση του εμβολίου

Όπως όλα τα φάρμακα, τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι περισσότερες από αυτές είναι ήπιες και δεν διαρκούν πολύ και σίγουρα δεν συμβαίνουν σε όλους. Τονίζεται ωστόσο ότι, ακόμα και αν παρουσιάσετε κάποια συμπτώματα μετά την 1η δόση, θα πρέπει να κάνετε και τη 2η δόση για καλύτερη προστασία.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου COVID-19 NUVAXOVID περιλαμβάνουν:

- πονοκέφαλο
- ναυτία, εμετό
- μυϊκό πόνο (μυαλγία) ή πόνο στις αρθρώσεις (αρθραλγία)
- τοπική ευαισθησία/πρήξιμο/ερυθρότητα στο σημείο εμβολιασμού
- αίσθημα κόπωσης
- πυρετό ($> 38^{\circ}\text{C}$)

Τα συμπτώματα συνήθως διαρκούν λιγότερο από μία εβδομάδα. Ωστόσο, εάν τα συμπτώματά σας φαίνεται να επιδεινώνονται ή εάν ανησυχείτε επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Ιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι οποιεσδήποτε εικαζόμενες ή ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται σε όσους λαμβάνουν εμβόλιο κατά της COVID-19 πρέπει να αναφέρονται μέσω του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

- Ηλεκτρονική υποβολή: www.kitrinikarta.gov.cy
- Έντυπη αποστολή της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμης από την ιστοσελίδα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: <https://www.moh.gov.cy/phs>
 - Μέσω ταχυδρομείου (ατελώς): Μονάδα Φαρμακευτικής Υπηρεσίες, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475, Λευκωσία, Αρ. τηλ. 22608607
 - Υποβολή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22608669

